

RECOGNIZED FOR
PROFESSIONAL USE.

ORAL RINSE

Antigingivitis

DIRECTIONS FOR USE: Fill cap to the "fill line" (15 mL). Swish in mouth undiluted for 30 seconds twice daily, after breakfast and before bedtime, expel remainder. Or, use as prescribed.

NOTE: To minimize medicinal taste, do not rinse with water immediately after use. Peridex oral rinse is not intended for ingestion and should be expectorated after rinsing.

RECONNU POUR
UTILISATION PROFESSIONNELLE

RINCE-BOUCHE

Anti-gingivite

MODE D'EMPLOI: remplir le bouchon jusqu'à la ligne de 15 mL. Se gargariser avec la solution non diluée pendant 30 secondes, deux fois par jour (après le déjeuner et avant le coucher), et recracher. Sinon, utiliser selon les indications du dentiste.

REMARQUE: pour réduire le goût médicamenteux de la solution, ne pas se rincer immédiatement après l'utilisation. Il faut


DIN 02237452

PERIDEX™




(Chlorhexidine Gluconate
Oral Rinse 0.12%)

(Rince-bouche au gluconate
de chlorhexidine 0,12 %)



3 48878 62027 3



LOT: 402301
EXP: JAN/2027
GTIN: 00348878620273

Pharmacy
1506 3rd Ave
Store # 4410
Tel: 403-563-8800

Drugstore Pharmacy
1506 3rd Ave
Store # 4410
Tel: 403-563-8800

Refills: 0

CHLORHEXIDINE GLUC 0.12% 250 ML

RINSE MOUTH WITH 15
ML LITRE(S) TWICE DAILY
AFTER BREAKFAST AND BEFORE
BEDTIME (SWISH IN THE MOUTH
FOR 30 SECONDS AND SPIT OUT)